# ЛИСТОВКА

## Metaxx 0,5 mg/ml перорална суспензия за котки и морски свинчета

**1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт**
Metaxx 0,5 mg/ml перорална суспензия за котки и морски свинчета

**2. Състав**
Всеки ml съдържа:
**Активно вещество**
Meloxicam 0,5 mg
**Помощни вещества**
Натриев бензоат (E211) 1,5 mg

Жълта до светложълта перорална суспензия.

**3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП**
Котки, морски свинчета.

**4. Показания за употреба**
Котки:
Облекчаване на лека до умерена следоперативна болка и възпаление след хирургични процедури при котки, напр. ортопедична хирургия и хирургия на меките тъкани.
Облекчаване на болката и възпалението при остри и хронични мускулно-скелетни заболявания при котки.

Морски свинчета:
Облекчаване на лека до умерена следоперативна болка, свързана с операция на меките тъкани, като например кастрация на мъжките морски свинчета.

**5. Противопоказания**
Да не се използва по време на бременност или лактация.
Да не се използва при котки, страдащи от стомашно-чревни нарушения, като дразнене и кръвоизливи, нарушена чернодробна, сърдечна или бъбречна функция и хеморагични нарушения.
Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.
Да не се използва при котки на възраст под 6 седмици.
Да не се използва при морски свинчета на възраст под 4 седмици.

**6. Специални предупреждения**
Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:
Да не се използва при дехидратирани, хиповолемични или хипотензивни животни, тъй като съществува потенциален риск от бъбречна токсичност.
Следоперативна употреба при котки и морски свинчета:
В случай че е необходимо допълнително обезболяване, трябва да се обмисли мултимодална болкотерапия.
Хронични мускулно-скелетни разстройства при котките:
Реакцията на дългосрочната терапия трябва да се проследява на редовни интервали от ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарния лекарствен продукт на животните:
Мелоксикам и други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) могат да предизвикват реакции на свръхчувствителност. Хора с установена свръхчувствителност към НСПВС трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.
Измийте ръцете си след употреба.
Случайното поглъщане на продукта може да предизвика стомашно-чревни ефекти, като гадене и стомашна болка. Избягвайте случайното поглъщане от деца.
Не оставяйте напълнената спринцовка без надзор. Неизядената медикаментозна храна трябва да се изхвърли незабавно, а купата да се измие добре.
При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:
Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана по време на бременност и лактация. Не се прилага по време на бременност или лактация.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:
Други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), диуретици, антикоагуланти, аминогликозидни антибиотици и вещества с висока степен на свързване с протеините могат да се конкурират за свързване и по този начин да доведат до токсични ефекти.
Мелоксикам не трябва да се прилага заедно с други НСПВС или глюкокортикостероиди. Трябва да се избягва едновременното приложение на потенциално нефротоксични лекарства.

При котките предварителното третиране с противовъзпалителни вещества, различни от мелоксикам в единична доза от 0,2 mg/kg, може да доведе до допълнителни или засилени неблагоприятни реакции и съответно трябва да се спазва период без лечение с такива ветеринарни лекарствени продукти в продължение на най-малко 24 часа преди началото на лечението. Периодът без лечение обаче трябва да бъде съобразен с фармакологичните особености на използваните преди това продукти.

Предозиране:
Мелоксикам има тесен терапевтичен диапазон на безопасност при котки и клинични признаци на предозиране могат да се наблюдават при относително малки нива на предозиране.
В случай на предозиране се очаква неблагоприятните реакции, изброени в раздела за неблагоприятни реакции, да бъдат по-тежки и по-чести. В случай на предозиране трябва да се започне симптоматично лечение.

При морски свинчета свръздоза от 0,6 mg/kg телесна маса, приложена в продължение на 3 дни, последвана от доза от 0,3 mg/kg в продължение на още 6 дни, не предизвиква неблагоприятни реакции, характерни за мелоксикам.
Безопасността на дози, надвишаващи 0,6 mg/kg, не е оценявана при морски свинчета.

Специални ограничения за употреба и специални условия за употреба:
Не е приложимо.

Основни несъвместимости:
При липса на данни за съвместимост този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти.

**7. Неблагоприятни реакции**
Котки:

| Честота | Неблагоприятна реакция |
|---|---|
| Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения): | Загуба на апетит[1], летаргия[1]; повръщане[1], диария[1], кръв в изпражненията (окултна)[1], стомашно-чревни язви[1]; Бъбречна недостатъчност[1] Повишени стойности на чернодробните ензими. |

[1]Типични неблагоприятни реакции на НСПВС

Тези неблагоприятни реакции в повечето случаи са преходни и изчезват след прекратяване на лечението, но могат да бъдат сериозни или фатални.

Котки и морски свинчета:
Ако се появят неблагоприятни реакции, лечението трябва да се прекрати и да се потърси съвет от ветеринарен лекар.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забелязвате някакви неблагоприятниреакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия или местния представител на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване.

**8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение**
За перорално приложение.

**Дозировка**
**Котки:**
Следоперативна болка и възпаление след хирургични процедури:
След първоначално лечение с подходяща инжекционна форма на мелоксикам, разрешена за котки, продължете лечението 24 часа по-късно с Metaxx 0,5 mg/ml перорална суспензия за котки в доза 0,05 mg мелоксикам/kg телесна маса, т.е. 0,1 ml/kg телесна маса.
Пероралната проследяваща доза може да се прилага веднъж дневно (на 24-часови интервали) в продължение на до четири дни.

Остри мускулно-скелетни разстройства:
Първоначалното лечение е с еднократна перорална доза от 0,2 mg мелоксикам/kg телесна маса, т.е. 0,4 ml/kg телесна маса през първия ден. Лечението трябва да продължи веднъж дневно чрез перорално приложение (на интервали от 24 часа) в доза от 0,05 mg мелоксикам/kg телесна маса, т.е. 0,1 ml/kg телесна маса, докато продължава острата болка и възпаление.

Хронични мускулно-скелетни разстройства:
Първоначалното лечение е с еднократна перорална доза от 0,1 mg мелоксикам/kg телесна маса, т.е. 0,2 ml/kg телесна маса през първия ден. Лечението трябва да продължи веднъж дневно чрез перорално приложение (на 24-часови интервали) в поддържаща доза от 0,05 mg мелоксикам/kg телесна маса, т.е. 0,1 ml/kg телесна маса. Клиничен отговор обикновено се наблюдава в рамките на 7 дни. Лечението трябва да бъде преустановено най-късно след 14 дни, ако не се наблюдава клинично подобрение.

**Дозировка**
**Морски свинчета:**
Следоперативна болка, свързана с операция на меките тъкани:
Първоначалното лечение е с еднократна перорална доза от 0,2 mg мелоксикам/kg телесна маса, т.е. 0,4 ml/kg телесна маса на ден 1 (преди операцията).
Лечението трябва да продължи веднъж дневно чрез перорално приложение (на 24-часови интервали) в доза от 0,1 mg мелоксикам/kg телесна маса, т.е. 0,2 ml/kg телесна маса на ден 2 (след операцията).

По преценка на ветеринарния лекар в отделни случаи дозата може да се титрира до 0,5 mg/kg телесна маса, т.е. 1 ml/kg телесна маса. Безопасността на дози, надвишаващи 0,6 mg/kg телесна маса, обаче не е оценявана при морски свинчета.

**Начин и метод на приложение**
Да се прилага или смесен с храна (котки), или директно в устата (котки и морски свинчета), като се използва предоставената спринцовка с вместимост 1 ml, градуирана със скала в ml и стъпка 0,02 ml.
Направете съответната спринцовка телесната маса на животното.

Доза от 0,05 mg мелоксикам/kg телесна маса: 0,1 ml/kg телесна маса
Доза от 0,1 mg мелоксикам/kg телесна маса: 0,2 ml/kg телесна маса
Доза от 0,2 mg мелоксикам/kg телесна маса: 0,4 ml/kg телесна маса

**9. Съвети за правилното прилагане на продукта**
Особено внимание трябва да се обърне на точността на дозиране.
Разклатете добре бутилката преди употреба и избягвайте замърсяване по време на употреба.
Препоръчителната доза не трябва да се превишава.

**10. Карентни срокове**
Не е приложимо.

**11. Специални условия за съхранение**
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
5 ml: Да се съхранява при температура под 30°C. Да не се охлажда или замразява.
10 ml: Да не се охлажда или замразява.
25 ml: Да не се охлажда или замразява.
Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху картона и флакона след срока на годност.
Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.
Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 6 месеца.

**12. Специални предпазни мерки при унищожаване**
Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.
Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране.
Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар или фармацевт как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

**13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти**
Да се отпуска само по лекарско предписание.

**14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки**
0022-3256
5 ml ( във флакон с вместимост 10 ml)
10 ml
25 ml
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

**15. Дата на последната редакция на текста**
03/2025
Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

**16. Данни за връзка**
Притежател на разрешението за търговия:
Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Нидерландия

Производител, отговарящ за освобождаването на партиди:
Produlab Pharma BV
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Нидерландия

Местни представители и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:
"ВЕТ ПРО КОМЕРС" ООД
4004 Пловдив, България
ул."Васил Левски" №258
тел.: +359 897 84 39 18
info@vepco.bg

VEPCO

За всякаква информация относно този ветеринарен лекарствен продукт, моля, свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за търговия.