

RP Vacc BG инжекционна емулсия за гълъби

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

RP Vacc BG инжекционна емулсия за гълъби

2. СЪСТАВ

Една доза от ваксината 0,3 ml съдържа:

Активни вещества:

Pigeon rotavirus, щам Ro/D, инактивиран ≥ 52.2 EU\*

Pigeon paramyxovirus type 1, щам 988M, инактивиран ≥ 6.47 log2 HI\*\*

\* ELISA units in chicken

\*\* Haemagglutination inhibition in chicken

Адjuванти:

Paraffin oil 156.9 mg

Sorbitan oleate 15.8 mg

Polysorbate 80 5.7 mg

Помощни вещества:

| Качествен състав на помощните средства и другите съставки | Количествен състав, ако информацията е важна с оглед на правилното прилагане на ветеринарния лекарствен продукт |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thiomersal                                                | max. 0.036 mg                                                                                                   |

Бяла емулсия с лесно разклащаща се утайка.

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Гълъби.



4. ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

За активна имунизация на гълъби от 4-седмична възраст нататък:

- за намаляване на честотата и тежестта на клиничните признаци, макроскопските лезии и

отделянето на вируса, причинени от ротавирус на гълъбите група А, генотип G18P[17] (PiRV),

- за намаляване на смъртността, честотата и тежестта на клиничните признаци, причинени от парамиксовирус тип 1 (PMV1).

Начало на имунитета: 2 седмици след схемата на първична ваксинация  
Продължителност на имунитета: 8 месеца (PiRV) / 9 месеца (PMV1) след първичната ваксинационна схема (доказано чрез провокационен тест), чрез интрамускулна инжекция.

При интрамускулно приложение, в полеви проучвания са установени нива на антитела, сравними с тези, получени при провокационен тест, дори една година след последната инжекция. Продължителността на имунитета не е установена при подкожно приложение.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения:

Да се ваксинират само здрави животни.

Времето за ваксинация или реваксинация трябва да се определя въз основа на оценка на съотношението полза/риск от отговорния ветеринарен лекар, като се вземат предвид разпространението на съответните заболявания в развъдниците и най-рисковите периоди за предаване на инфекции (например началото на летателния сезон, изложбения сезон и/или размножителния период).

В полевото проучване наличието на майчини антитела срещу PiRV не показва отрицателно въздействие върху развитието на постваксиналния имунен отговор.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

За потребителите:

Този ветеринарен лекарствен продукт съдържа минерално масло. Случайното инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подуване, особено при инжектиране в става или пръст и в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако не е оказана навреме лекарска помощ. Ако по случайност сте инжектирани с този ветеринарен лекарствен продукт, потърсете спешно съвет от лекар и носете листовката с Вас, дори да е инжектирано съвсем малко количество. Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет от лекаря.

За лекарите:

Този ветеринарен лекарствен продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани малки количества, случайното инжектиране с този ветеринарен лекарствен продукт може да предизвика поява на силен оток, който може например да доведе до исхемична некроза и дори до загуба на пръст. Необходима е НЕЗАБАВНА, компетентна хирургическа намеса. Възможно е да се наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено ако са засегнати пулпата на пръста или сухожилието.

Птици носачки:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана по време на яйценосене.

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарни лекарствени продукти. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарен лекарствен продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай.

Предозиране:

Не е приложимо.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти.

7. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Гълъби:

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чести<br>(1 до 10 на 100 третирани животни): | Апатия <sup>1</sup><br>Незабавна болка след инжектиране <sup>2</sup><br>Подуване в мястото на инжектиране <sup>3</sup> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Лека апатия един ден след ваксинацията, обикновено с продължителност до 1 ден.

<sup>2</sup> Без съпътстващо подуване, обикновено с продължителност до 1 ден след интрамускулно приложение.

<sup>3</sup> До 0,5 cm в диаметър, обикновено с продължителност до 5 дни след подкожно приложение.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на ветеринарния лекарствен продукт. Съобщенията трябва да се изпращат, за предпочитане чрез ветеринарен лекар, или на притежателя на разрешението за търговия или на местния му представител, или на националния компетентен орган чрез националната система за съобщаване.

За съответните данни за връзка вижте листовката.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, НАЧИНИ И МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно или интрамускулно приложение.

Една доза: 0,3 ml

Прилага се интрамускулно в бедрения мускул или подкожно в гръбната част на шията, в посока към опашката (не към главата).

Първична ваксинационна схема:

Първа доза: от 4-седмична възраст нататък

Втора доза: 3 седмици по-късно

Реваксинация:

Прилага се една доза не по-късно от една година след последната ваксинация.

При стада с високо ниво на инфекциозен натиск от PiRV и/или PMV1 се препоръчва реваксинация на гълъбите на всеки 8–9 месеца след последната ваксинация.

9. СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

При интрамускулно приложение на ваксината иглата трябва да се въвежда под остър ъгъл, а не перпендикулярно на мястото на инжектиране.

Разклатете добре преди и от време на време по време на прилагане. Преди приложение оставете ваксината да се затопли до стайна температура. Прилагайте при обичайни асептични условия, като използвате стерилни спринцовки и игли.

Използвайте подходящо градуирани спринцовки, които позволяват точно приложение на ваксиналната доза от 0,3 ml.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец. Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 8 часа.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички национални системи за събиране, приложими за съответния ветеринарен лекарствен продукт.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Да се отпуска по лекарско предписание.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗМЕРИ ОПАКОВКИ

0022-3366

Съклен флакон (тип I), затворен с хлоробутилова гумена запушалка, запечатана с алуминиева капачка.

Размер на опаковката: Картонена кутия с 1 флакон от 50 дози

15. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

02/2026

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. ДАННИ ЗА ВРЪЗКА

Притежател на разрешението за търговия и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

ВЕТ ПРО КОМЕРС ООД

4023 Пловдив, България

ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2

Тел: +359 897 84 39 18

Email: [info@verpco.bg](mailto:info@verpco.bg)

Производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

PHARMAGAL BIO, s. r. o.

Murgašova 5

949 01 Nitra

Slovak Republic

tel: +421 37 65 33 171

Email: [bio@pharmagalbio.sk](mailto:bio@pharmagalbio.sk)

За всякаква информация относно този ветеринарен лекарствен продукт, моля, свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за търговия.

